

Sergio Rhein Schirato



Departamento de Fisiologia

[exec](#)

Exercícios

[exercicio1_r.txt](#)

[exercicio_4.2f.txt](#)

[exercicio_4.3f.txt](#)

[exercicio_4.4.txt](#)

[exercicio_4.5.txt](#)

[exercicio_5.1.txt](#)

[exercicio_5.2.txt](#)

[exercicio_5.3f.txt](#)

[exercicio_106.2.1.txt](#)

[exercicio_7.2.r](#)

[exercicio_7.2.a.txt](#)

[exercicio_7.2.b.f.txt](#)

[exercicio_7.2.cf.txt](#)

[exercicio_8.1.txt](#)

[exercicio_8.2.txt](#)

[exercicio_109.2.txt](#)

Propostas de função

— [Diogo Melo](#) 2017/06/05 17:06

Acho que ambas as propostas precisam de mais detalhes para serem avaliadas. Comento abaixo.

Proposta de Função A

A função irá produzir as séries de Fourier para qualquer função polinomial dada pelo usuário, permitindo a sua transformação em uma série de senos e cossenos. O produto desta função será de fundamental importância para a subsequente efetivação da Transformada Discreta de Fourier, quando esta se fizer necessária.

Este processo possibilita uma melhor compreensão do comportamento de séries de dados, decompondo-as em diversas harmônicas independentes e facilitando a segregação de eventuais ruídos. Tenho hoje utilizado as séries de Fourier (e sua transformada) na análise das mudanças da variabilidade cardíaca seguida à descompressão em indivíduos após exposição a ambiente hiperbárico. Esta função automatizará parte do processo.

Histórico

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) desenvolveu suas séries ao estudar a propagação de calor em corpos sólidos. Admitindo que essa propagação dar-se-ia por ondas de calor e, considerando que a forma mais simples de uma onda é uma função senoidal, Fourier demonstrou que qualquer função pode ser decomposta como uma soma de senos e cossenos, com amplitudes e fases calculadas. Este trabalho dá origem à Transformada Discreta de Fourier e, posteriormente, à Transformada Rápida de Fourier, hoje utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento.

Argumentos da função

- fun_entrada: qualquer função escrita na forma de um polinômio - k: número de coeficientes gerados pela função - lim_inf: limite inferior de integração (padrão: -pi) - lim_sup: limite superior de integração (padrão: pi)

Retorno da Função

Um dataframe contendo uma série de k coeficientes, calculados entre os limites definidos de integração, e divididos em duas colunas: (i) senos; (ii) cossenos. Adicionalmente a função retornará um gráfico contendo o a curvatura da função original e a curvatura da função escrita em termos de senos e cossenos para k coeficientes.

— [Diogo Melo](#) 2017/06/05 17:06

Não entendi se a ideia é fazer uma série de Fourier analítica ou computacional. A função só vai funcionar para polinômios? Não seria mais legal fazer uma aproximação computacional para qualquer função? Se for computacional, sugiro usar um pacote pronto e focar na visualização.

Nesse caso, Seria legal incluir um gráfico a função original e da

aproximação de Fourier para diferentes tamanhos da série de fourier.

Proposta de Função B

A função gerará o expoente de Hurst para um dado vetor numérico dado pelo usuário. O expoente de Hurst é uma medida de auto-correlação de uma série numérica, variando entre 0 e 1. Um resultado próximo de 0 representa uma grande persistência da série na proximidade de um ponto, enquanto um resultado próximo de 1 representa uma grande tendência de manutenção de direcionamento (crescimento ou decrescimento). O resultado 0,5 representa a completa aleatoriedade dos números. Tenho hoje usado o expoente de Hurst em algoritmos para operações em mercados financeiros.

Histórico

O expoente (ou coeficiente, como também é conhecido) de Hurst foi criado pelo engenheiro Harold Edwin Hurst (1880–1978) na década de 1960. Após anos efetuando análises de variações pluviométricas e níveis de reservatórios, Hurst percebeu que registros passados influenciavam de alguma forma observações correntes. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, Benoît Mandelbrot (1924–2010) identificou a íntima relação em o expoente de Hurst e as dimensões fractais estudadas por ele. Hoje praticamente todos os trabalhos que envolvam a geração de séries aleatórias se utilizam do expoente de Hurst.

Argumentos da função

dados: um vetor numérico de qualquer extensão.

Retorno da Função

Um objeto denominado Hurst, que representará o expoente de Hurst associado ao vetor dado. Adicionalmente a função retornará um gráfico cujo eixo “x” será a o logaritmo da quantidade de elementos do vetor e o eixo “y” será o logaritmo da divisão entre a amplitude da série pelo desvio-padrão.

— *Diogo Melo* 2017/06/05 17:06

Bacana, mas um pouco simples. Existe alguma outra modificação do expoente de Hurst? Talvez a função possa fazer o calculo num vetor grande usando um esquema de “sliding window”, pra ver se o expoente muda ao longo do vetor analisado.

[help_da_funcao_hurst.txt](#) [trabalho_final.r](#)

From:
<http://ecor.ib.usp.br/> - **ecoR**

Permanent link:
http://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=05_curso_antigo:r2017:alunos:trabalho_final:sergio.schirato:start 

Last update: **2020/08/12 06:04**